

Задачи к лекции «Интеграл по траекториям в многочастичной квантовой механике»

Побойко Игорь

26 апреля 2017

Упражнения

Упражнение 1. Преобразование Боголюбова Пусть есть пара состояний, описываемых лестничными операторами $\{\hat{a}_1, \hat{a}_1^\dagger\}$ и $\{\hat{a}_2, \hat{a}_2^\dagger\}$. Рассмотрите линейные преобразования вида:

$$\hat{B} = U\hat{A}, \quad U = \begin{pmatrix} u & v \\ v' & u' \end{pmatrix}, \quad \hat{A} = \begin{pmatrix} \hat{a}_1 \\ \hat{a}_2^\dagger \end{pmatrix}, \quad \hat{B} = \begin{pmatrix} \hat{b}_1 \\ \hat{b}_2^\dagger \end{pmatrix} \quad (1)$$

1. При каком условии на матрицу U (на числа u, v, u', v') такое преобразование, носящее название преобразования Боголюбова, является каноническим — сохраняет коммутационные соотношения? Рассмотрите бозонный и фермионный случай.
2. Рассмотрите преобразования Боголюбова с вещественными коэффициентами. Покажите, что матрицу U можно явно параметризовать в терминах тригонометрических функций $\sin, \cos$ (для фермионов) и $\sinh, \cosh$ (для бозонов).

Упражнение 2 Используя преобразование Боголюбова, диагонализуйте следующий гамильтониан:

$$\hat{H} = \omega(\hat{a}_1^\dagger \hat{a}_1 + \hat{a}_2^\dagger \hat{a}_2) + \Delta(\hat{a}_1 \hat{a}_2 + \hat{a}_2^\dagger \hat{a}_1^\dagger), \quad \omega > \Delta \quad (2)$$

Рассмотрите бозонный и фермионный случай.

Задача. Слабонеидеальный Бозе-газ

В данной задаче мы будем рассматривать слабонеидеальный Бозе-газ, описываемый следующим гамильтонианом (в рамках большого канонического ансамбля с химическим потенциалом μ):

$$\hat{H}' \equiv \hat{H} - \mu\hat{N} = \int dx \left(\frac{\nabla\hat{\Psi}^\dagger \nabla\hat{\Psi}}{2m} - \mu\hat{\Psi}^\dagger \hat{\Psi} + \frac{g}{2}\hat{\Psi}^\dagger \hat{\Psi}^\dagger \hat{\Psi} \hat{\Psi} \right) \quad (3)$$

1. Используя формализм функционального интеграла, найдите «седло», соответствующее спонтанному нарушению $U(1)$ симметрии — «конденсатное» решение $\psi_0(\mathbf{x})$. Для простоты можете выбрать его вещественным.
2. Квадратичные флуктуации в окрестности этого «седла» соответствуют квазичастицам — они соответствуют элементарным возбуждениям системы. Чтобы их найти, предлагается использовать формализм вторичного квантования; для этого рассмотрите каноническое преобразование полевых операторов $\hat{\Psi}(\mathbf{x}) = \psi_0(\mathbf{x}) + \hat{\psi}(\mathbf{x})$, после чего гамильтониан $\hat{H}'$ разложите до квадратичного порядка по $\hat{\psi}(\mathbf{x})$.
3. Для диагонализации полученного гамильтониана первым шагом стандартным образом перейдите к преобразованию Фурье $\hat{\psi}(\mathbf{x}) = \frac{1}{\sqrt{V}} \sum_{\mathbf{k}} \hat{a}_{\mathbf{k}} e^{i\mathbf{k}\mathbf{x}}$. После такой подстановки, в гамильтониане должны возникнуть «аномальные» члены, не сохраняющие число частиц — вида $\hat{a}_{\mathbf{k}} \hat{a}_{-\mathbf{k}}$.
4. Используя преобразование Боголюбова (см. упражнение) вида $\hat{a}_{\mathbf{k}} = u_{\mathbf{k}} \hat{b}_{\mathbf{k}} + v_{\mathbf{k}} \hat{b}_{-\mathbf{k}}^\dagger$, диагонализуйте полученный гамильтониан, приведя его к виду $\hat{H} = \sum_{\mathbf{p}} \xi_{\mathbf{p}} \hat{b}_{\mathbf{p}}^\dagger \hat{b}_{\mathbf{p}} + \text{const}$. Найдите спектр квазичастичных возбуждений $\xi_{\mathbf{p}}$.
5. Вычислите среднее число надконденсатных частиц $N_1 = \langle \hat{N}_1 \rangle = \int dx \langle \hat{\psi}^\dagger(\mathbf{x}) \hat{\psi}(\mathbf{x}) \rangle$. В процессе решения мы предполагали, что практически все частицы находятся в конденсате, поэтому построенная тут теория работает только если $N_1 \ll N$. Для выяснения физического смысла полученного критерия, удобно параметризовать константу связи g через длину рассеяния a согласно¹ $g = \frac{4\pi a}{m}$.

¹Длина рассеяния — это характеристика задачи рассеяния. Она определяется как амплитуда рассеяния медленных частиц в s -канале — $f(\theta) \approx f_{l=0} = -a$ ($E \rightarrow 0$); и через неё выражается сечение рассеяния согласно $\sigma = 4\pi a^2$. Стоит только отметить, что в данном случае мы имеем дело с рассеянием тождественных частиц, из-за чего некоторые стандартные формулы из задачи рассеяния требуют модификации.